


*Tu tienda de productos
de apicultura para Pozoblanco
y el Valle de los Pedroches y para cualquier lugar.*



APIGUARD

Tratamiento Natural contra la varroa. Estrato de tomillo presentado en pasta gel, para poner por la piquera. Natural y de gran eficacia contra todo tipo de ácaros. Ideal para abejas melíferas.

 <p>USO VETERINARIO</p> <p>Gel para uso en colmenas</p> <p>Composición Cada bandeja de 50g de APIGUARD contiene timol al 25% en una matriz de gel de liberación lenta especialmente diseñada.</p> <p>Ingrediente activo: Timol E.P. 25% Excipiente csp 1 bandeja de 50 g de gel</p> <p>Propiedades farmacológicas y farmacocinéticas Timol tiene acción acaricida. Sin embargo, su modo de acción exacto no se ha determinado del todo. Actúa directamente sobre los ácaros por inhalación y contacto. La desnaturalización proteica es uno de los probables modos de acción en ácaros. Se cree que 2/3 de la acción se obtiene por la inhalación y 1/3 por el contacto directo a través de las abejas melíferas. Sin embargo, la proporción relativa de cada una de las vías puede variar con la temperatura y la actividad de las abejas.</p>	<p>máxima diaria prevista durante el tratamiento sea menor a los 15°C, ni cuando la temperatura sea superior a los 40°C. Combinar colonias débiles previo al tratamiento. Todas las colonias de un colmenar o apiario deberán tratarse en forma simultánea.</p> <p>Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción No se conocen.</p> <p>Posología y modo de administración Tratamiento en la colmena: dos aplicaciones de 50 g de gel por colonia con un intervalo de dos semanas. Máximo de dos tratamientos por año.</p> <p>Método de administración Abrir la colmena. Despegar la lámina metálica que sella la bandeja dejando una de las esquinas de la lámina sujeta a la bandeja. Colocar la bandeja abierta en una posición central encima de los cuadros, con el gel hacia arriba. Asegúrese de que haya un espacio libre de al menos 0,5 cm entre la parte superior de la bandeja y la tapa de la colmena. Cerrar la colmena. Pasadas dos semanas retirar la primera bandeja y colocar una nueva siguiendo las mismas instrucciones. Dejar el producto en la colonia hasta que la bandeja esté vacía. Retirar el producto al instalar las alzas en la colonia.</p> <p>La eficacia del producto se potencia si el producto se utiliza al final del verano después de la cosecha de miel, cuando la cantidad de generaciones de abejas presentes se reduce. Sin embargo, en el caso de infestaciones graves, el producto también puede utilizarse durante la primavera, cuando las temperaturas estén por encima de los 15°C. La eficacia puede variar de una colonia a otra debido a la naturaleza de la aplicación. Por lo tanto, APIGUARD deberá utilizarse como un tratamiento entre otros dentro de un Programa Integrado de Gestión de Plagas, y la caída de ácaros deberá controlarse periódicamente. Si se siguiera observando una caída de ácaros significativa durante el invierno o primavera siguientes, se recomienda utilizar un tratamiento secundario, de invierno o primavera, contra varroa adicional al de APIGUARD.</p> <p>Sobredosificación El uso de una dosis superior a la recomendada (50 g de gel por aplicación, que corresponde a 12,5 g de timol) podría provocar trastornos en el comportamiento de la colonia (agitación, huidas o una mayor mortalidad). En caso de sobredosis, retirar el exceso de producto de la colonia.</p> <p>Advertencias especiales Se deberá tener cuidado para asegurarse de ceñirse a la pauta posológica, ya que una dosificación inapropiada podría tener un efecto perjudicial sobre la colonia.</p>	<p>Tiempo de espera Miel: cero días. No utilizar durante la mielada.</p> <p>Precauciones especiales de seguridad que ha de tomar la persona que administre o manipule el producto Puesto que existe la posibilidad de una dermatitis de contacto e irritación de la piel y los ojos, el contacto directo con la piel y los ojos deberá evitarse. Utilizar guantes impermeables además del equipo de protección habitual al manipular el producto. Después de la aplicación, lavarse las manos, así como el material que estuvo en contacto con el gel, con agua y jabón. En caso de contacto con la piel, lavar minuciosamente el área afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos minuciosamente con cantidades abundantes de agua limpia y corriente y consultar a un médico. No inhalar.</p> <p>Precauciones especiales de conservación No almacenar a temperaturas superiores a los 30°C. No congelar. Mantener sin abrir en el paquete original. Proteger de la luz solar directa. No almacenar el producto en la proximidad de pesticidas u otras sustancias químicas que podrían contaminar el producto.</p>	<p>Almacenar alejado de productos alimenticios. Todo producto no utilizado o material de residuo deberá desecharse de conformidad con las exigencias nacionales.</p> <p>Registro N°: 1487 ESP</p> <p>Título de la autorización de comercialización VITA (EUROPE) LIMITED 21/23 Wote Street Basingstoke, Hampshire RG21 7NE REINO UNIDO</p> <p>Fabricante Laleham Healthcare Limited; Sycamore Park, Mill Lane Alton, Hampshire GU34 2PR REINO UNIDO</p> <p>Presentaciones Caja con 10 bandejas conteniendo 50 g de gel. Mantener fuera del alcance de los niños. Sin prescripción veterinaria</p> <p>veterinaria ESTEVE Laboratorios Dr. ESTEVE, S.A. Av. Mar de Déu de Montserrat, 221 08041 BARCELONA (España)</p> <p>• APIGUARD es una marca registrada de Vita (Europe) Limited, Basingstoke, R.U.</p>
--	--	---	---

Venga a informarse, consultemos sin compromiso, les atenderemos en:

Miel Valle de los Pedroches
MIEL, POLEN, JALEA REAL, PROPOLEO, CERA, COSMETICA, MATERIAL APICOLA.
CRONISTA SEPULVEDA Nº 12; Tel. 637302517
(Junto al Ayuntamiento)
www.mieldelvalledelospedroches.com
mieldelvalledelospedroches@hotmail.com
14400 POZOBLANCO (Córdoba)

