

*Tu tienda de productos
de apicultura para Pozoblanco
y el Valle de los Pedroches y para cualquier lugar.*



BAYVAROL

Para el control de los ácaros de la varroasis en las abejas

Composición:

1 Tira contiene 3,6 mg. de flumetrina

Indicaciones:

Para el tratamiento de la varroasis sensible a flumetrina en las abejas.

Modo de empleo:

Colgar las tiras de Bayvarol en la zona central del nido de cría, entre los cuadros, de modo que las abejas puedan posarse sobre ambas caras. Para tal fin se doblan las lengüetas (línea de puntos) en el mismo sentido y se cuelga la placa del marco de madera (Fig. 1).

Para colonias grandes, con varias zonas de cría, se pueden unir dos tiras por su extremo inferior (Fig.2), de manera que puedan ser introducidas y extraídas de los pasillos, sin separar los cuadros de cría.

Posología:

Para una colonia de desarrollo normal se emplean 4 tiras.

La dosis se reducirá a la mitad- es decir a dos tiras- al tratarse de enjambres y de colmenas jóvenes.

Para las colonias grandes que ocupan varias zonas de cría, se colocan 4 tiras por zona. Las tiras deben distribuirse en los pasillos centrales de la colonia, en cada una de las zonas de cría.

Momento y duración del uso:

Se consigue una mejor eficacia cuando Bayvarol se emplea al final del verano después de la cosecha de la miel. Idealmente, no deben utilizarse las tiras de Bayvarol durante los periodos de máximo flujo de miel. No obstante, Bayvarol puede emplearse en cualquier época del año en caso de graves infestaciones cuando está en peligro la supervivencia de la colonia.

Las tiras deberán permanecer en las colmenas un máximo de seis semanas y luego deberán ser retiradas.

Precauciones:

Únicamente para uso veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños

Únicamente para el tratamiento en abejas de la varroasis sensible a flumetrina.

Evitar el contacto de las tiras con la miel que vaya a ser destinada a consumo humano.

Protección para la persona que manipule el medicamento:

No comer, beber o fumar. Lavarse las manos después de manipular las tiras, antes de las comidas y después del trabajo.

Tiempo de espera:

No se requiere tiempo de espera para la miel sea cual sea el momento de utilización de Bayvarol en el año. Otros productos de las abejas no deberán destinarse a consumo humano hasta la primavera siguiente al tratamiento.

Conservación:

No almacenar por encima de 25 °C.

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de alimentos, bebidas y piensos.

No abrir los sobres hasta el momento inmediatamente previo a su utilización. Una vez abierto, las tiras deben ser utilizadas y desechadas en 6 semanas.

No utilizar una vez transcurrida la fecha de caducidad.

El producto no utilizado deberá ser eliminado de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales en la materia.

La flumetrina es peligrosa para los peces. No contaminar estanques, vías fluviales o acequias con las tiras o con los envases usados.

Venga a informarse, consultemos sin compromiso, les atenderemos en:

<p style="text-align: center;"><i>Miel Valle de los Pedroches</i> MIEL, POLEN, JALEA REAL, PROPOLEO, CERA, COSMÉTICA, MATERIAL APÍCOLA. CRONISTA SEPULVEDA Nº 12; Tel. 637302517 (Junto al Ayuntamiento) www.mieldelvalledelospedroches.com mieldelvalledelospedroches@hotmail.com 14400 POZOBLANCO (Córdoba)</p>
